

**ՀԱԿԱՔԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԽՄԲԵՐԸ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 728-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի «20» ենթակետը՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. Հաստատել՝

- 1) Հակաբիոտիկների նշանակման խմբերը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի;
- 2) Հակաբիոտիկների ընտրության չափանիշները՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:
2. Բժշկական հաստատությունների ղեկավարներին առաջարկել՝ ապահովել սույն հրամանով սահմանված չափանիշների կիրառումը հակաբիոտիկների նշանակման ժամանակ:
3. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանին՝ ապահովել սույն հրամանի տեղադրումը առողջապահության նախարարության պաշտոնական էջում:
4. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդ օրվանից:

Ա.ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ՀԱԿԱՔԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԽՄԲԵՐԸ

1. Հակաբիոտիկների նշանակման ժամանակ հիմք ընդունել հետևյալ դասակարգումը, որի համաձայն հակաբակտերիային դեղերը բաժանվում են երեք խմբի.

- 1) Առաջին խումբը կազմում են **առաջնային հասանելիության հակաբիոտիկները**, որում ընդգրկված են հաճախ հանդիպող հիվանդություններից/համախտանիշներից առնվազն մեկի ժամանակ առաջին կամ երկրորդ ընտրության դեղերը՝ Ցանկ 1:
- 2) Երկրորդ խումբը ներառում է **մշտադիտարկվող հակաբիոտիկները**, որոնք ունեն կայունության առաջացման բարձր պոտենցիալ, հետևաբար անհրաժեշտ է կիրառել որպես առաջին կամ երկրորդ ընտրության միջոց միայն առանձնահատուկ, սահմանափակ թվով ցուցումների դեպքում՝ Ցանկ 2:
- 3) Երրորդ խմբում ընդգրկված են **պահուստային հակաբիոտիկները**, որոնք պետք է դիտարկել որպես վերջին ընտրության դեղեր՝ նշանակելով միայն այն դեպքերում, երբ բոլոր այլընտրանքային տարբերակներն այլևս արդյունավետ չեն (օրինակ՝ բազմադեղակայուն բակտերիաներով պայմանավորված կյանքին սպառնացող վարակների ժամանակ)՝ Ցանկ 3 :

ՑԱՆԿ

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ

Բետա-լակտամային հակաբակտերիային դեղեր		Այլ հակաբակտերիային դեղեր	
Ամօքսիցիլին Amoxicillin	Ցեֆոտաքսիմ* Cefotaxime	Ամիկացին Amikacin	Գենտամիցին Gentamicin
Ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու Amoxicillin+Clavulanic acid	Ցեֆտրիաքսոն* Ceftriaxone	Ազիթրոմիցին* Azithromycin	Մետրոնիդազոլ Metronidazole
Ամպիցիլին Ampicillin	Կլօքսացիլին Cloxacillin	Քլորամֆենիկոլ Chloramphenicol	Նիտրոֆուրանտոին Nitrofurantoin
Բենզաթին բենզիլպենիցիլին Benzathine Benzylpenicillin	Ֆենօքսիմեթիլպենիցիլին Pnenoxymethylpenicillin	Ցիպրոֆլօքսացին* Ciprofloxacin	Սպեկտոմիցին Spectinomycin
Բենզիլպենիցիլին Benzylpenicillin	Պիպերացիլին+տազոբակտամ* Piperacillin+Tazobactam	Կլարիթրոմիցին* Clarithromycin	Սուլֆամեթօքսազոլ +տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole +Trimethoprim
Ցեֆալեքսին Cefalexin	Պրոկային բենզիլպենիցիլին Procaine Benzylpenicillin	Կլինդամիցին Clindamycin	Վանկոմիցին (ներքին ընդունման) * Vancomycin(oral)
Ցեֆազոլին Cefazolin	Մերոպենեմ* Meropenem	Դօքսիցիկլին Doxycycline	Վանկոմիցին (ներարկման) *

			<i>Vancomycin(pare nteral)</i>
Ֆեֆիքսիմ* Cefixime			

***Մշտադիտարկվող հակաբիոտիկներ, որոնք անհրաժեշտ է կիրառել սահմանափակ ցուցումների դեպքում**

ՑԱՆԿ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ

Քվինոլոններ և ֆտորքվինոլոններ/Quinolones/Fluoroquinolones (օր. [՝] ցիպրոֆլոքսացին/Ciprofloxacin, լևոֆլոքսացին/Levofloxacin, մօքսիֆլոքսացին/Moxifloxacin, նորֆլոքսացին/Norfloxacin)
Երրորդ սերնդի գեֆալոսպորիններ/3-rd generation cephalosporins (բետա-լակտամազի արգելակիչներով կամ առանց), (օր. [՝] ցեֆիքսիմ/Cefixime, ցեֆտրիաքսոն/Ceftriaxone, ցեֆոտաքսիմ/Cefotaxime, ցեֆտազիդիմ/Ceftazidim)
Մակրոլիդներ/Macrolides (օր. [՝] ազիթրոմիցին/azitromycin, կլարիթրոմիցին/clarithromycin, էրիթրոմիցին/erythromycin)
Գլիկոպեպտիդներ/Glycopeptides (օր. [՝] տեյկոպլանին/teicoplanin, վանկոմիցին/vancomycin)
Անտիպսևդոմոնալ պենիցիլիններ+բետա-լակտամազի արգելակիչներ/Antipseudomonal penicillins + beta-lactamase inhibitor (օր. [՝] պիպերացիլին-տազոբակտամ/piperacillin-tazobactam)
Պենեմներ/Penems (օր. [՝] ֆարոպենեմ/Faropenem)

ՑԱՆԿ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ

Ազտրեոնամ/Aztreonam	Ֆոսֆոմիցին (ն/ե)/Fosfomicin (IV)
Չորրորդ սերնդի գեֆալոսպորիններ/ 4-rd generation cephalosporins (օր. գեֆեպիմ/cefepim)	Օքսազոլիդինոններ/Oxazolidinones (օր. լինեզոլիդ/Linezolid
Հինգերորդ սերնդի գեֆալոսպորիններ/5-rd generation cephalosporins (օր. գեֆտարոլին/ceftaroline)	Տիգեցիկլին/Tygecycline
Պոլիմիքսիններ/Polymixins (օր. պոլիմիքսին Բ/Polymyxin B, կոլիստին/Colistin)	Դապտոմիցին/Daptomycin

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Բետա-լակտամային հակաբակտերիային դեղեր					
Ամօքսիցիլին	Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի` 125 մգ/5մլ, 250 մգ/5 մլ [Մ]*				
	Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր` 250 մգ, 500 մգ				
	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 250 մգ, 500 մգ, 1գ				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</th> <th>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (թեթև, միջին ծանրության) - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) [Մ] - Ծանր սուր թերսնուցում[Մ] - Թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության սրացում - Ստորին միզուղիների վարակ - Միջին ականջի բորբոքում - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ] - Սինուսիտ - Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտ </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Սուր մանրէային մենինգիտ </td> </tr> </tbody> </table>	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	<ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (թեթև, միջին ծանրության) - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) [Մ] - Ծանր սուր թերսնուցում[Մ] - Թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության սրացում - Ստորին միզուղիների վարակ - Միջին ականջի բորբոքում - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ] - Սինուսիտ - Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտ 	<ul style="list-style-type: none"> - Սուր մանրէային մենինգիտ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ				
<ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (թեթև, միջին ծանրության) - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) [Մ] - Ծանր սուր թերսնուցում[Մ] - Թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության սրացում - Ստորին միզուղիների վարակ - Միջին ականջի բորբոքում - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ] - Սինուսիտ - Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտ 	<ul style="list-style-type: none"> - Սուր մանրէային մենինգիտ 				

	<p>- Գաստրոդուդենիտ, խոցային հիվանդություն (H.pilory ծագման)</p>	
<p>Ամօքսիցիլին+ քլավուլանաթթու</p>	<p>Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի` 125 մգ ամօքսիցիլին +31.25մգ քլավուլանաթթու/5 մլ և 250 մգ ամօքսիցիլին +62.5 մգ քլավուլանաթթու/5 մլ [Մ] Դեղահատ` 500 մգ+ 125 մգ Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 500 մգ+100 մգ, 1000 մգ +200 մգ</p>	

	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) [Մ] - Բարդացած ներորովայնային վարակ (թեթև, միջին ծանրության) - Թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության սրացում - Ներհիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) - Ցածր ռիսկային ֆեբրիլ նեյտրոպենիա - Ստորին միզուղիների վարակ - Սինուսիտ - Մաշկի և փափուկ հյուսվածքների վարակ 	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ոսկրա-հոդային վարակ - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (թեթև, միջին ծանրության) - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) - Միջին ականջի բորբոքում
Ամպիցիլին	<p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 500 մգ, 1գ</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) [Մ] - Բարդացած ծանր սուր թերսնուցում[Մ] - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ] 	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Սուր մանրէային մենինգիտ
Բենզաթին բենզիլպենիցիլին	<p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 900 մգ բենզիլպենիցիլին (= 1.2 միլիոն ՄՄ)/5 մլ [Մ], 1.44 գ բենզիլպենիցիլին (= 2.4 միլիոն ՄՄ)/5 մլ</p>	

	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ <ul style="list-style-type: none"> - Սիֆիլիս - ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինիզիտ 	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բենզիլպենիցիլին	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 600 մգ (= 1 միլիոն ՄՄ), 3 գ (= 5 միլիոն ՄՄ)	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ <ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (ծանր) [Մ] - Բարդացած ծանր սուր թերանուցում[Մ] - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ] - Սիֆիլիս 	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ Սուր մանրէային մենինգիտ[Մ]
Ցեֆալեքսին	Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի` 125մգ/5 մլ, 250 մգ/5 մլ Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր` 250 մգ	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ <ul style="list-style-type: none"> - Խրոնիկ օբստրուկտիվ թոքային հիվանդության սրացում - Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտ - Մաշկի և փափուկ հյուսվածքների վարակ
Ցեֆազոլին*	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 1գ *(ցուցված է նաև վիրահատական կանխարգելման համար), Նշանակվում է մեկ ամսականից բարձր տարիքում:	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

		Ոսկրա-հողային վարակ
Ցեֆիքսիմ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Դեղապատիճ կամ դեղահատ` 200 մգ, 400 մգ	
	Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի` 100/5մլ [Մ]	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
		<ul style="list-style-type: none"> - Սուր, ինվազիվ բակտերիալ դիարեա/դիզենտերիա - Գոնորեա (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>)
Ցեֆոտաքսիմ*, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 250 մգ	
	*Երրորդ սերնդի ցեֆալոսպորին որպես ընտրություն հոսպիտալացված նորածինների համար:	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
	<ul style="list-style-type: none"> - Սուր մանրէային մենինգիտ - Ծանր արտահիվանդանոցային թոքաբորբ - Բարդացած ներորովայնային վարակ (թեթև, միջին ծանրության) - Բարդացած ներորովայնային վարակ (ծանր) - Ներհիվանդանոցային թոքաբորբ - Պիելոնեֆրիտ կամ պրոստատիտ (ծանր) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ակտիվ, ինվազիվ բակտերիալ դիարեա/դիզենտերիա - Ոսկրա-հողային վարակ - Պիելոնեֆրիտ կամ պրոստատիտ (թեթև, միջին ծանրության) - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ]
Ցեֆտրիաքսոն*, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 250 մգ, 1գ	
	*Չնշանակել կալցիումի հետ, բացառել հիպերբիլիռուբինեմիայով երեխաներին նշանակումը:	

	<p>Նշանակվում է 41 շաբաթականից բարձր ճշտված գեստացիոն տարիքում:</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Սուր մանրէային մենինգիտ - Ծանր արտահիվանդանոցային թոքաբորբ - Բարդացած ներորովայնային վարակ (թեթև, միջին ծանրության) - Բարդացած ներորովայնային վարակ (ծանր) - Ներհիվանդանոցային թոքաբորբ - Գոնորեա (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) - Պիելոնեֆրիտ կամ պրոստատիտ (ծանր) 	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Սուր, ինվազիվ մանրէային դիարեա/դիզենտերիա - Ոսկրա-հոդային վարակ - Պիելոնեֆրիտ կամ պրոստատիտ (թեթև, միջին ծանրության) - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ]
<p>Կլոքսացիլին*</p>	<p>Դեղապատիճ` 500 մգ, 1գ Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 500 մգ Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի` 125 մգ /5մլ *Կլոքսացիլինը, դիկլոքսացիլինը և ֆլուկլոքսացիլինը նախընտրելի է նշանակել ներքին ընդունման համար՝ հաշվի առնելով լավ կենսամատչելիությունը:</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ոսկրա-հոդային վարակ - Մաշկի և փափուկ հյուսվածքների վարակ 	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ]

Ֆենոքսիմեթիլպենիցիլին	Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի` 250 մգ/5մլ	
	Դեղահատ` 250 մգ	
Պիպերացիլին +տագոբակտամ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 2գ + 250 մգ , 4 գ + 500 մգ	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (թեթև, միջին ծանրության) - Ստրեպտոկակյին տոնզիլոֆարինգիտ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Պրոկային բենզիլպենիցիլին*	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 1գ (= 1 միլիոն ՄՄ), 3 գ (= 3 միլիոն ՄՄ) , *Խորհուրդ չի տրվում նեոնատալ սեպսիսի ժամանակ որպես առաջին ընտրության դեղ:	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Սիֆիլիս [Մ]	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Սիֆիլիս
Յեֆտագիդիմ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 250մգ, 1գ	

<p>Մերոպենեմ*, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ</p>	<p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 500մգ, 1գ -3 ամսականից բարձր *Իմիպենեմ +ցիլաստատին համակցությունը այլընտրանքային տարբերակ է՝ բացառությամբ սուր մանրէային մենինգիտի, երբ նախընտրելի է մերոպենեմը:</p>	
<p>Ազտրեոնամ, ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ</p>	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p>	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Սուր բակտերիային մանրէային մենինգիտ երեխաների մոտ[Մ] - Բարդացած ներորովայնային վարակ (ծանր) - Բարձր ռիսկային ֆեբրիլ նեյտրոպենիա - Երեխաների սեպսիս
<p>Հինգերորդ սերնդի ցեֆալոսպորիններ (բետա-լակտամազի արգելակիչներով կամ առանց), օր.՝ ցեֆտարոլին, ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ</p>	<p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 400մգ, 600 մգ</p>	
<p>Չորրորդ սերնդի ցեֆալոսպորիններ (բետա-լակտամազի արգելակիչներով կամ</p>	<p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի` 500մգ, 1գ, 2գ</p>	

առանց), օր: ցեֆեպիմ, պահուստային խումբ		
Այլ հակաբակտերիային դեղեր		
Ամիկացին	Ներարկման դեղաձևեր՝ 250մգ/մլ, 500մգ/2մլ	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Պիելոնեֆրիտ կամ պրոստատիտ (ծանր)	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Բարձր ռիսկային ֆեբրիլ նեյտրոպենիա - Նորածինների և երեխաների սեպսիս [Մ] - Ներհիվանդանոցային և բարդացած թոքաբորբ
Ազիթրոմիցին*, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿԿՈՂ ԽՈՒՄԲ	Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 250 մգ, 500 մգ Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի՝ 200 մգ/5 մլ *Միանվագ դեղաչափով նշանակվում է նաև տրախոմայի, տրեպանոմայի ժամանակ:	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - <i>Chlamydia trachomatis-ով հարուցված վարակ</i> - Խոլերա[Մ] - Գոնորեա (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) - <i>Կապոյտ հազ</i>	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Սուր ինվազիվ մանրէային դիարեա/դիզենտերիա - Գոնորեա (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ - Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտ
Քլորամֆենիկոլ	Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 250 մգ Ներարկման յուղային դեղակախույթ՝ 0,5գ, 1գ	

	<p>Նշանակվում է 2 տարեկանից բարձր երեխաների և մեծահասակների համաճարակային մենինգիտի հավանական բուժման նպատակով:</p> <p>Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 150 մգ/5 մլ</p> <p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 1գ</p>	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <p>Սուր մանրէային մենինգիտ</p>
<p>Ցիպրոֆլոքսացին, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿԿՈՂ ԽՈՒՄԲ</p>	<p>Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 250 մգ/5 մլ [Մ]</p> <p>Ներերակային կաթիլաներարկման լուծույթ՝ 2 մգ/մլ [Մ]</p> <p>Դեղահատ՝ 250 մգ</p>	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Սուր ինվազիվ մանրէային դիարեա/դիզենտերիա - Ցածր ռիսկային ֆեբրիլ նեյտրոպենիա - Պիելոնեֆրիտ կամ պրոստատիտ (թեթև, միջին ծանրության) <p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Խոլերա - Բարդացած ներորովայնային վարակ (թեթև, միջին ծանրության) - Ծանր կամ ձգձգած թոքաբորբ
<p>Կլարիթրոմիցին*, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿԿՈՂ ԽՈՒՄԲ</p>	<p>Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 500 մգ</p> <p>Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի՝ 125 մգ/5 մլ, 250մգ/5մլ</p> <p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 500մգ</p> <p>*Որպես այլընտրանք կարող է նշանակվել էրիթրոմիցին:</p>	

	<p>Կլարիթրոմիցինը կարող է ընդգրկվել նաև մեծահասակների մոտ H.pylor-ի դեմ համակցված բուժման սխեմաներում:</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ Արտահիվանդանոցային ծանր թոքաբորբ</p>	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտ</p>
Կլինդամիցին	<p>Դեղապատիճ՝ 150 մգ Ներարկման լուծույթ՝ 150 մգ Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 75մգ/5մլ [Մ]</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p>	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Ոսկրա-հոդային վարակ</p>
Դօքսիցիկլին	<p>Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 25մգ/5մլ [Մ], 50մգ/5մլ[Մ] Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 50 մգ [Մ], 100 մգ Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 100 մգ 8 տարեկանից ցածր երեխաներին նշանակվում է միայն կյանքին սպառնացող վարակների բուժման նպատակով՝ այլընտրանքային դեղերի բացակայության դեպքում</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Chlamydia trachomatis-ով հարուցված վարակ</p>	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Խոլերա[Մ] - Արտահիվանդանոցային</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Խոլերա[Մ] 	<ul style="list-style-type: none"> թոքաբորբ (թեթև, միջին ծանրության) - Թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության սրացում
Գենտամիցին	<p>Ներարկման դեղաձևեր՝ 10մգ/2մլ, 40մգ/2մլ</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Արտահիվանդանոցային թոքաբորբ (սուր) [Մ] - Բարդացած ծանր թերսնուցում[Մ] - Նորածինների և երեխաների սեպսիս[Մ] 	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Գոնորեա (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>)
Մետրոնիդազոլ	<p>Ներարկման դեղաձևեր՝ 500մգ/100մլ</p> <p>Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 200մգ/5մլ</p> <p>Մոմիկ՝ 500մգ, 1գ</p> <p>Դեղահատ՝ 200մգ-400մգ</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Clostridium difficile</i>-ով հարուցված վարակ - Բարդացած ներորովայնային վարակ (թեթև, միջին ծանրության) - Բարդացած ներորովայնային վարակ (ծանր) 	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Բարդացած ներորովայնային վարակ (թեթև, միջին ծանրության)

	<ul style="list-style-type: none"> - Հեշտոցային տրիխոմոնազ - H.pilory գաստրոդոդենիտ / խոցային հիվանդություն 	
Նիտրոֆուրանտոին	<p>Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 25 մգ/5մլ</p> <p>Դեղահատ՝ 100մգ</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ստորին միզուղիների վարակ 	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սպեկտինոմիցին	<p>Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 2գ</p>	
	<p>ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p>	<p>ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ</p> <p>Գոնորեա (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>)</p>
Սուլֆամեթոքսազոլ+ Տրիմեթոպրիմ*	<p>Ներարկման դեղաձևեր՝ 400մգ+80մգ/5մլ 800մգ+160մգ/10 մլ</p> <p>Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 200 մգ+40մգ/5մլ</p> <p>Դեղահատ՝ 100մգ+20մգ, 400մգ+80մգ, 800մգ+160մգ</p> <p>*Ստորին միզուղիների վարակների դեպքում որպես այլընտրանքային տարբերակ</p>	

	կարող է նշանակվել նաև միայն տրիմերոպրիմ:	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Ստորին միզուղիների վարակ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Սուր, մանրէային բակտերիալ դիարեա/դիզենտերիա
Վանկոմիցին, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Դեղապատիճ՝ 125մգ, 250 մգ	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - <i>Clostridium difficile</i> -ով հարուցված վարակ
Վանկոմիցին, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԽՈՒՄԲ	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 250 մգ	
	ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ - Բարձր ռիսկային ֆեբրիլ նեյտրոպենիա
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ		
Դապտոմիցին	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 350 մգ, 500մգ	
Ֆոսֆոմիցին	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 2գ, 4գ	
Օքսազոլիդինոններ, օր.՝ լինեզոլիդ	Ներերակային ներարկման դեղաձևեր՝ 600մգ/300մլ Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի՝ 100մգ/5մլ Դեղահատ՝ 400մգ, 600մգ	
Պոլիմիքսիններ, օր.՝ կոլիստին	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 1 միլիոն ՄՄ	
Տիգեցիկլին	Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 50 մգ	

[Մ]*-մանկական